

هفته ملی بدون دخانیات

۱۰-۴ خرداد ماه



جهانی بدون دخانیات، با تعهد به ترک


" تعهد به ترک "

شعار سازمان جهانی بهداشت در کمپین روز جهانی بدون دخانیات در سال ۲۰۲۱



۳۱ مین روز از ماه می:
روز جهانی بدون دخانیات

سیگار یا قلیان!!!



توتون و تنباکو عامل مرگ حدود ۸ میلیون نفر در سال است. دود سیگار حاصل از سوختن تنباکو، و دود قلیان از طریق سوختن ذغال و گرم شدن تنباکوی بالای آن حاصل میشود که حداقل ۷۰ نوع ماده شیمیایی سرطان زا شناخته شده و با استنشاق این دودها، به بدن وارد میشوند. افراد غیر سیگاری که در معرض دود سیگار هستند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان ریه و بیماریهای مختلف قرار دارند. امروزه ثابت شده قرار گرفتن در معرض دود سیگار، با دیابت نوع ۲ میتواند مرتبط باشد.





سیگار الکترونیکی

سیگارهای الکترونیکی یا اصطلاحاً ویپ VAPE ، نیز افراد سیگاری و اطرافیان را در معرض نیکوتین و سایر مواد شیمیایی مضر قرار می دهد.

قرار گرفتن کودکان در معرض سیگارهای الکترونیکی سلامت آنها را به طور جدی تهدید کرده و خطر نشت مایعات دستگاهها یا بلعیدن مایعات توسط کودکان نیز وجود دارد. همچنین از طریق آتش سوزی و انفجار نیز باعث صدمات جدی از جمله سوختگی می شوند.

از طرفی سیگارهای الکترونیکی و محصولات تنباکوی گرم، ممکن است حاوی باتری هایی باشند که به دفع خاص نیاز دارند و در حال حاضر، بیشتر کارتریج های مایع سیگارهای الکترونیکی پلاستیکی بوده و قابل استفاده مجدد و بازیافت نیستند.

دخانیات و سرطان

مصرف دخانیات مسئول ۲۵٪ از سرطان های منجر به مرگ در سراسر جهان است.



استعمال دخانیات دلیل سرطان ریه و مسبب مرگ بیش از دو سوم افراد مبتلا به این سرطان در جهان است. همچنین باعث بروز سرطان دهان، لب، گلو (حلق و حنجره) و مری می شود. افراد سیگاری افراد سیگاری به طور قابل توجهی در معرض خطر ابتلا به سرطان خون حاد میلوئیدی، سرطان حفره های سینوس بینی و پارانازال، سرطان روده بزرگ، کلیه، کبد، لوزالمعده، معده، تخمدان و سرطان دستگاه ادراری تحتانی (از جمله مثانه، حالب و لگن کلیه) قرار دارند.

دخانیات و بیماریهای ریوی



از هر پنج نفر سیگاری یک نفر در طول زندگی خود به بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD) مبتلا خواهد شد، به ویژه افرادی که از دوران کودکی و نوجوانی سیگار کشیدن را شروع می کنند؛ زیرا دود توتون رشد و تکامل ریه را به طور قابل توجهی کند می کند. همچنین می تواند آسم را در بزرگسالان تشدید کند. مصرف دخانیات خطر تبدیل سل از حالت نهفته به حالت فعال را به بیش از دو برابر رسانده و پیشرفت طبیعی بیماری را نیز بدتر می کند.

دخانیات و بیماری‌های قلبی



فقط چند نخ سیگار در روز و استعمال گاه به گاه دخانیات یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار به عروق قلب آسیب رسانده، باعث تجمع پلاک‌ها و ایجاد لخته‌های خون می‌شود و بدین ترتیب خطر بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد.

افراد سیگاری چهار برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی و دو برابر بیشتر در معرض خطر سکته مغزی دارند.

اختلالات گوارشی ها

افراد سیگاری احتمالاً در طول زندگی خود دچار اختلالات گوارشی مانند زخم معده، بیماری التهابی روده، همراه با گرفتگی شکم، اسهال مداوم، تب و خونریزی مقعدی و سرطان های دستگاه گوارش می شوند.



هم چنین جویدن تنباکو و دود ناشی از سیگار و قلیان باعث زردی دندان ها و ایجاد پلاک اضافی روی دندان می شود. مصرف دخانیات خطر ابتلا به بیماری پریودنتال (بیماری لثه) را افزایش می دهد؛ یک بیماری التهابی مزمن که لثه ها و استخوان فک را از بین می برد و منجر به از دست دادن دندان می شود. حتی استفاده از دخانیات بدون دود باعث ایجاد بوی بد دهان می شود.

مشکلات چشمی ، گوشی و پوستی با دخانیات

افراد سیگاری بیشتر دچار کم شنوایی می شوند. علاوه بر این، سیگار کشیدن باعث بسیاری از بیماری های چشمی شده که در صورت عدم درمان، می تواند نابینایی دائمی ایجاد کند. در افراد سیگاری خطر آب مروارید نیز بیشتر است. برخی شواهد نشان می دهد که استعمال دخانیات باعث گلوکوم نیز می شود؛ بیماری ای که در آن فشار داخل چشم افزایش یافته و می تواند به بینایی آسیب برساند.



مصرف سیگار سبب چروکیدگی پوست به خصوص در اطراف چشم ها و لب، خشکی، پیری و از بین رفتن خاصیت ارتجاعی پوست (ناشی از تخلیه ویتامین A) شده و در طولانی مدت با محدود شدن جریان خون، موجب ایجاد حالت چرمی میشود و خطر ابتلا به پسوریازیس که یک بیماری التهابی و خارش دار پوستی است، افزایش می یابد.

استعمال دخانیات، آلزایمر و تضعیف سیستم ایمنی

اجزای دود تنباکو سیستم ایمنی را ضعیف کرده و فرد را در معرض خطر عفونت های مختلف از جمله عفونت های ریوی قرار می دهد.

سیگار کشیدن یک عامل خطر ابتلا به زوال عقل شناخته شده است.

همچنین افراد مبتلا به نقص ایمنی مانند مبتلایان به ایدز، کسانی که با فیبروز سیستیک، مولتیپل اسکلروز یا سرطان زندگی می کنند، در معرض خطر بیشتری از ابتلا به بیماری های همراه و مرگ زودرس قرار دارند.

بیماری آلزایمر شایع ترین شکل زوال عقل است و تخمین زده می شود که ۱۴٪ موارد آلزایمر در سطح جهان به سیگار کشیدن مربوط می شود.

تأثیرات منفی دخانیات در زنان و تولیدمثل

سیگار کشیدن با ناباروری، زایمان زودرس، تولد نوزادانی با وزن کم و سقط جنین همراه است. همچنین از تعداد، تحرک و کیفیت عملکرد اسپرم‌ها در مردان می‌کاهد.

زنان سیگاری بیشتر در معرض خطر حاملگی خارج رحمی قرار دارند، این یک عارضه بالقوه کشنده برای مادر است که تخمک بارور شده در آن به خارج از رحم متصل می‌شود.



زنانی که سیگار می‌کشند بیشتر دچار قاعدگی دردناک و علائم شدید یائسگی می‌شوند. یائسگی در زنان سیگاری ۴-۱ سال زودتر اتفاق می‌افتد، زیرا سیگار کشیدن باعث کاهش تولید تخمک در تخمدان‌ها شده و در نتیجه عملکرد دستگاه تولید مثل از دست می‌رود و در نتیجه سطح استروژن پایین می‌آید.



سرطان در زنان سیگاری

برخی از مطالعات ارتباطی بین استعمال دخانیات و افزایش خطر

ابتلا به سرطان پستان را (به ویژه در میان افراد سیگاری و زنانی که قبل از اولین بارداری شروع به سیگار کشیدن می کنند) نشان داده اند.



همچنین سیگار کشیدن به عنوان خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در زنان آلوده به ویروس پاپیلومای انسانی شناخته شده است.



کودکان و دود سیگار؟


کودکان در سنین مدرسه که در معرض اثرات مضر دود سیگار هستند، از طریق التهاب مجاری تنفسی به ریه ها در معرض خطر آسم قرار دارند.

کودکان زیر ۲ سال، ممکن است به بیماری گوش میانی مبتلا شوند که احتمالاً منجر به کم شنوایی و ناشنوایی می شود.

به علاوه در کودکان سیگاری از عملکرد ریه ها کاسته می شود و به عنوان اختلالات تنفسی مزمن در بزرگسالی بر آنها نیز تأثیر می گذارد.

دخانیات و کرونا

شدت بیماری کووید-۱۹ در افراد سیگاری < غیر سیگاری



کووید ۱۹ یک بیماری عفونی

تنفسی است که در درجه اول به ریه‌ها حمله میکند. از طرفی استعمال دخانیات باعث اختلال در عملکرد ریه شده و شرایط برای مقابله با کووید ۱۹ دشوارتر می‌شود.

دخانیت و آلودگی محیط زیست

- ۱- ته‌سیگار از عمده زباله‌هایی است که در سراسر جهان دور ریخته می‌شود و حاوی مواد خطرناکی از جمله آرسنیک، سرب، نیکوتین و فرمالدئید هستند؛ این مواد به محیط‌های آبی و خاک وارد می‌شوند و عواقب جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارند.
- ۲- دود تنباکو سه نوع گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند: دی‌اکسید کربن، متان و اکسیدهای نیتروژن که به میزان قابل توجهی در آلودگی هوای سطح شهر نقش دارند.
- ۳- پرورش توتون و تنباکو معمولاً شامل استفاده قابل ملاحظه‌ای از مواد شیمیایی از جمله سموم دفع آفات، کودها و تنظیم‌کننده‌های رشد می‌شود و این مواد شیمیایی منابع آب آشامیدنی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
- ۴- جنگل‌زدایی برای پرورش توتون و تنباکو عواقب جدی زیست‌محیطی از جمله از دست دادن تنوع زیستی، فرسایش و تخریب خاک، آلودگی آب و افزایش دی‌اکسید کربن در جو را دارد.
- ۵- به همه اینها تعداد درخت مورد نیاز برای تولید سیگار، کبریت و اجزای بسته‌بندی مانند کاغذ، جوهر، سلفون، فویل، چسب، زباله‌های کارتنی و جعبه‌هایی که برای توزیع و بسته‌بندی استفاده می‌شود را بیفزایید.

فواید ترک سیگار

فواید ترک سیگار تقریباً فوری خود را نشان می دهد. فقط پس از ۲۰ دقیقه ترک سیگار، ضربان قلب و فشار خون کاهش می یابد.

در عرض ۱۲ ساعت، سطح مونوکسیدکربن در خون به حد طبیعی می رسد. طی ۱۲-۲ هفته گردش خون بهبود یافته و عملکرد ریه ها افزایش می یابد. طی ۹-۱ ماه سرفه و تنگی نفس کاهش می یابد.



